

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय,
2. समस्त अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय,
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम,
मध्यप्रदेश

विषय :- ब्लड बैंक से रेफर एचआईवी टेस्टिंग की रिपोर्टिंग के संबंध में गाइडलाइन।

संदर्भ :- नाको का पत्र क्रमांक T-12015/40/2006-NACO (ICTC) Dt. 27 Sep 2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पत्र के साथ संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें ब्लड बैंक से रेफर एचआईवी टेस्टिंग की रिपोर्टिंग के संबंध में गाइडलाइन दी गयी है।

उपरोक्त गाइडलाइन का पालन जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र।

//

संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल, दिनांक 15/2/18

पृ. क्रमांक / एफ 21-35 / आई.सी.टी.सी. / 2018 / 475
प्रतिलिपि-

1. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, रक्त सुरक्षा, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. एम.एड ई. शाखा, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को समिति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

T-12015/40/2006-NACO(ICTC)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
National AIDS Control Organization
Basic Services Division

9th Floor, Chanderlok Building,
36 Janpath, New Delhi-11001
Dated: 27th September 2017

Office Memorandum

**Sub: - Guidelines on reporting of HIV testing for in-referrals from Blood Bank –
reg.**

In accordance with recommendations of Technical Resource Group on ICTC and Technical Expert Group on Blood Transfusion Services, the guidelines for reporting of HIV testing for in-referrals from Blood Bank is as below.

- The test done at blood bank may be considered a test of triage approach and referred to as A0.
- HIV result should be considered HIV inconclusive even when the first test (A1) performed at the ICTC is negative, since the test for triage uses an assay of higher sensitivity like fourth generation test, NAT etc.
- Retesting after fourteen days, must be offered to all such blood donors referred from the Blood bank even if they are found negative on the first test done at ICTC to test for sero-conversion.

This guideline will help to improve referrals from blood and organ donors to the HCTS facility and detect the infection in its early stage, as well as prevent HIV sero-reactive donors from enrolling as repeat donors and re-entering the donor pool.



(Dr. K.S Sachdeva)
Dy. Director General
Basic Services Division, NACO

To,
The Project Director, All State AIDS Control Societies

Copy for information to.

1. PPS to Additional Secretary & DG NACO, MOHFW/Gol
2. PS to Joint Secretary, NACO, New Delhi